

HAR MIT BARN NEDSAT HØRELSE?



Mit barn har periodevis hørenedsættelser

Børn kan få periodevis hørenedsættelser, når de er forkølede, har væske i mellemøret, mellemørebetændelse og andet.

Ved periodevis hørenedsættelser er det vigtigt, at forældrene gør familie, pædagoger og lærere opmærksomme på, at barnets hørelse er nedsat, så de voksne omkring barnet kan tage hensyn. De kan hjælpe barnet med den rigtige placering i forhold til lyd-kilden. De voksne må være opmærksomme på, om barnet har hørt, hvad de har sagt.

Mit barn har en permanent hørenedsættelse

Har børn permanente hørenedsættelser, har de brug for at de voksne rundt om barnet hjælper og støtter med at kompensere for høretabet.

Jo større høretab - jo mere opmærksomhed fra omgivelserne har barnet brug for.

Har dit barn et permanent høretab, er det vigtigt, at du drøfter barnets vanskeligheder med pædagogerne i barnets daginstitution eller lærerne i skolen og kontakte en tale-høre-pædagog.

Tegn på hørenedsættelse kan være:

Hos børn under 1 år

Reagerer ikke på høj lyd

Pludrer på en ens måde og uden nuancer, når de er 8 – 9 mdr.

Hos børn mellem 1 - 3 år

Reagerer ikke på små opfordringer

Har en forsinket sprogudvikling

Hører ikke, når en person kommer ind i stuen, hvis det sidder med ryggen til døren.

Bruger intensivt øjnene til at orientere sig med

Hos børn mellem 3 - 6 år

Reagerer ikke på opfordringer uden at forældrene peger

Har en lidt sløret udtale

Kan have en forsinket sprogudvikling

Misforstår ofte

Råber ved almindelig samtale

Hos børn over 6 år

Handler kun korrekt på dele af et budskab

Misforstår ofte hvad der bliver sagt

Har en sløret udtale

Beder om at få skruet op for lyden på fjernsynet

Trækker sig fra leg med mange

Ændrer adfærd (indadvendt eller reagerer udad) når mange personer er sammen